

PRIPREMA PACIJENATA ZA IZVOĐENJE IZDISAJNOG TESTA ZA HELICOBACTER PYLORI

- 1) Ne uzimati hranu najmanje 6h prije izvođenja testa
- 2) Potrebno je da prođe najmanje 4 nedjelje nakon sistemskog liječenja antibioticima i najmanje 2 nedjelje nakon posljednje doze lijekova za smanjenje želučane kiseline (inhibitora protonske pumpe* i H2 blokatora**)
- 3) Ne preporučuje se kod osoba sa djelimičnom gastrektomijom. Po preporuci ljekara test se može izvoditi i kod osoba mlađih od 12 godina.

Za izvođenje testa potrebno je u laboratoriji provesti 30-40 minuta.

*Inhibitori protonske pumpe koji su registrovani kod nas su:

1. Omezol (Alkaloid)
2. Loseprazol (Liconsa)
3. Omep (Salutas)
4. Omeprazid (Nobelfarma)
5. Omeprazol ICP i Omnibel (Belmac)
6. Omeprol (Jadran)
7. Omeprol (Sofarimex)
8. Controloc (Nycomed)
9. Pulcet (Nobelfarma)
10. Nolpaza (Krka)
11. Amarin(Medochemie)
12. Lonzul ilonzul S (Krka)
13. Sabax (Hemofarm)
14. Lansobel i Lansoprazol (Belmac)

**H2 blokatori:

1. Ranisan
2. Ranital
3. Ranitidin
4. Famotidi