

PRIPREMA PACIJENTA ZA UZIMANJE BRISEVA

BRISEVI GRILA, USNE I NOSNE DUPLJE

1. Ujutru prije uzimanja brisa najbolje je da pacijent ne doručkuje, da ne pije bilo kakav napitak, niti da sprovodi higijenu usne duplje. Ukoliko je pacijent jeo ili pio neki napitak treba da prođe minimum 30 minuta do uzimanja brisa.
2. Bris je potrebno uzeti prije antibiotske terapije.
3. Potrebno je da prođe najmanje 12h od lokalne aplikacije antiseptičkog sredstva do uzimanja brisa.
4. Kontrolni uzorak poslije antibiotske terapije uzeti poslije najmanje 7 dana od završene terapije ili po zahtjevu ljekara.

BRISEVI GRILA I NOSA – DJECA

Kod uzimanja brisa grla i nosa djeci, roditelj treba dijete da drži u krilu, jednu ruku da stavi preko obje njegove ruke, a drugu ruku da mu stavi na čelo i tako pridržava glavu dok mu stručno lice uzima briseve.

GENITALNI BRISEVI

1. **Cervikalni bris na hlamidije, mikoplazme, ureaplazme i PAPA test** – ne uzimati briseve u periodu ovulacije (sredina mjesečnog ciklusa).
2. **Uzorci iz genitalnog trakta (vaginalni i cervikalni bris)** -Pacijentkinja ne bi trebalo da ima seksualni odnos prethodnog dana

URETRALNI BRISEVI

Pacijent ne treba da urinira 1-2 sata prije uzimanja brisa.